

## ГЛОБАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

18,2 [16,1 – 19,0] миллиона человек имели доступ к антиретровирусной терапии (июнь 2016 г.)

36,7 [34,0 – 39,8] миллиона человек во всем мире жили с ВИЧ (конец 2015 г.)

2,1 [1,8 – 2,4] миллиона человек были инфицированы ВИЧ (конец 2015 г.)

1,1 миллиона [940 000–1,3 миллиона] человек умерли от болезней, обусловленных СПИДом (конец 2015 г.)

78 [69,5 – 87,6] миллиона человек были инфицированы ВИЧ с момента начала эпидемии (конец 2015 г.)

35 [29,6 – 40,8] миллиона человек умерли от болезней, обусловленных СПИДом, с момента начала эпидемии (конец 2015 г.)

### Люди, живущие с ВИЧ

- В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло 36,7 [34,0 – 39,8] миллиона.

### Люди, живущие с ВИЧ, имеющие доступ к антиретровирусной терапии

- По состоянию на июнь 2016 года 18,2 [16,1 – 19,0] миллиона человек, живущих с ВИЧ, имели доступ к антиретровирусной терапии – в июне 2015 года это число составляло 15,8 миллиона, а в 2010 году – 7,5 миллиона человек.
- Около 46% [43%–50%] всех взрослых, живущих с ВИЧ, имели доступ к лечению в 2015 году.
- Около 77% [69%–86%] беременных женщин, живущих с ВИЧ, имели доступ к антиретровирусным препаратам для профилактики передачи ВИЧ младенцам в 2015 году.

### Новые случаи инфицирования ВИЧ

- Во всем мире число людей, инфицированных ВИЧ в 2015 году, составило 2,1 [1,8 – 2,4] миллиона человек.
- С 2010 года число новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей снизилось на 50%.

- Во всем мире число детей, инфицированных ВИЧ в 2015 году, составило 150 000 [110 000–190 000] – в 2010 году это число составляло 290 000 [250 000–350 000].
- С 2010 года число новых случаев инфицирования ВИЧ среди взрослых не менялось.
- Каждый год с 2010 г. около 1.9 [1.9–2.2] миллиона взрослых было инфицировано ВИЧ.

### **Число смертей, обусловленных СПИДом**

- По сравнению с пиковым показателем в 2005 году, число смертей, связанных со СПИДом, снизилось на 45%.
- В 2015 году число людей, умерших в связи со СПИДом, во всем мире составило 1,1 миллиона [940 000–1,3 миллиона] человек – для сравнения в 2005 году это число составляло 2 [1,7–2,3] миллиона.

### **ВИЧ/туберкулез**

- С 2004 года число смертей в связи с туберкулезом среди людей, живущих с ВИЧ, снизилось на 32%.
- Туберкулез остается ведущей причиной смертности среди людей, живущих с ВИЧ, – на него приходится примерно одна третья часть смертей, связанных со СПИДом.
- В 2014 году процент ВИЧ-позитивных людей, больных туберкулезом, которые начали или продолжали получать антиретровирусную терапию, достиг 77%.

### **Инвестиции**

- По состоянию на конец 2015 года объем средств, выделенных на осуществление мер противодействия СПИДу в странах с низким и средним уровнем доходов, составил 19 млрд. долларов США (не включая страны, которые недавно перешли в категорию стран с высоким уровнем доходов).
- Внутренние средства составили 57% от общего объема средств, выделенных на противодействие СПИДу в странах с низким и средним уровнем доходов в 2015 году.
- По последним обновленным оценкам ЮНЭЙДС, в 2020 году на меры противодействия СПИДу потребуется 26,2 млрд. долларов США, а в 2030 году – 23,9 млрд. долларов США.

## **РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА – 2015 г.**

### **Азиатско-Тихоокеанский регион**

- В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, составило **5,1 [4,4–5,9] миллиона**.
- В 2015 году оценочное число новых случаев инфицирования ВИЧ в регионе составило **300 000 [240 000–380 000]**.

- В период с 2010 по 2015 гг. число новых случаев инфицирования ВИЧ снизилось на **5%**.
- В 2015 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе число людей, умерших от болезней, связанных со СПИДом, составило **180 000 [150 000–220 000]**.
  - В период с 2010 по 2015 гг. число смертей в связи со СПИДом в регионе снизилось на **24%**.
- Охват лечением составлял **41% [35%–47%]** всех людей, живущих с ВИЧ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- По оценкам, в 2015 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе **3 [2,3–3,8] миллиона** взрослых **не имели доступа** к антиретровирусной терапии.
- В 2015 году было зарегистрировано **19 000 [16 000–22 000]** новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  - С 2010 года число новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей в регионе снизилось на **26%**.

### **Страны Восточной и Южной Африки**

- В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ в странах Восточной и Южной Африки, составило **19 [17,7 – 20,5] миллионов**.
  - Больше половины от общего числа людей, живущих с ВИЧ в странах Восточной и Южной Африки – женщины.
- В 2015 году оценочное число новых случаев инфицирования ВИЧ в странах Восточной и Южной Африке составило **960 000 [830 000 – 1,1 миллиона]**.
  - В период с 2010 по 2015 гг. число новых случаев инфицирования ВИЧ снизилось на **14%**.
  - В странах Восточной и Южной Африки насчитывается **46%** от общего числа новых случаев инфицирования ВИЧ во всем мире.
- В странах Восточной и Южной Африки **470 000 [390 000–560 000]** людей умерли от болезней, связанных со СПИДом в 2015 году.
  - В период с 2010 по 2015 гг. число смертей в связи со СПИДом в странах Восточной и Южной Африки снизилось на **38%**.
- В странах Восточной и Южной Африки **10,3 миллиона** людей имели доступ к антиретровирусной терапии, что составило **54% [50-58%]** от числа всех людей, живущих с ВИЧ в регионе.
  - В 2015 году **59% [55%-64%]** взрослых женщин (в возрасте 15 лет и старше) и **44% [41-48%]** взрослых мужчин имели доступ к антиретровирусной терапии в странах Восточной и Южной Африки.
  - **Шесть из десяти человек**, получающих антиретровирусную терапию, живут в странах Восточной и Южной Африки.
- В странах Восточной и Южной Африки было зарегистрировано **56 000 [40 000–76 000]** новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей в 2015 году.
  - С 2010 года число новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей в регионе снизилось на **66%**.

## **Восточная Европа и Центральная Азия**

- В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии, составило **1,5 [1,4 – 1,7] миллиона**.
- В 2015 году оценочное число новых случаев инфицирования ВИЧ в регионе составило **190 000 [170 000–200 000]**.
  - **Число новых случаев инфицирования ВИЧ выросло на 57%** в период с 2010 по 2015 гг.
- В Восточной Европе и Центральной Азии **47 000 [39 000 – 55 000]** людей умерли от болезней, связанных со СПИДом в 2015 году.
- В период с 2010 по 2015 гг. число смертей в связи со СПИДом в регионе выросло на **22%**.
- Охват лечением составляет **21% [20%-23%]** от общего числа людей, живущих с ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии.
- В 2015 году было зарегистрировано **<1000 [<1000–1100]** новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей в Восточной Европе и Центральной Азии.

## **Латинская Америка и Карибский бассейн**

- В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ в Латинской Америке, составило **2 [1,7 – 2,3] миллиона**.
- В 2015 году оценочное число новых случаев инфицирования ВИЧ в регионе составило **100 000 [86 000–120 000]**.
  - Число новых случаев инфицирования ВИЧ не менялось в период с 2010 по 2015 гг.
- В Латинской Америке **50 000 [41 000–59 000]** людей умерли от болезней, связанных со СПИДом в 2015 году.
  - В период с 2010 по 2015 гг. число смертей в связи со СПИДом в регионе снизилось на **18%**.
- Охват лечением в 2015 году составлял **55% [47% – 64%]** от общего числа людей, живущих с ВИЧ в Латинской Америке.
- В 2015 году было зарегистрировано **2100 [1600–2900]** новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей в Латинской Америке.

## **Ближний Восток и Северная Африка**

- В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ на Ближнем Востоке и в Северной Африке, составило **230 000 [160 000–330 000]**.
- В 2015 году оценочное число новых случаев инфицирования ВИЧ в регионе составило **21 000 [12 000–37 000]**.
  - В период с 2010 по 2015 гг. **число новых случаев инфицирования ВИЧ выросло на 4%**.
- В 2015 году число смертей в связи со СПИДом на Ближнем Востоке и в Северной Африке составило **12 000 [8700–16 000]**.

- В период с 2010 по 2015 гг. **число смертей в связи со СПИДом в регионе выросло на 22%**.
- Охват лечением в 2015 году составлял **17% [12%–24%]** среди людей, живущих с ВИЧ на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
- В 2015 году было зарегистрировано **2100 [1400–3200]** новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

### **Западная и Центральная Африка**

- В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ в Западной и Центральной Африке, составило **6,5 [5,3 –7,8] миллиона**.
  - Примерно 60% от общего числа людей, живущих с ВИЧ в Западной и Центральной Африке, – женщины.
- В 2015 году оценочное число новых случаев инфицирования ВИЧ в Западной и Центральной Африке составило **410 000 [310 000 – 530 000]**.
  - В период с 2010 по 2015 гг. число новых случаев инфицирования ВИЧ снизилось на **8%**.
- В 2015 году в Западной и Центральной Африке **330 000 [250 000–430 000]** людей умерли от болезней, связанных со СПИДом.
  - В период с 2010 по 2015 гг. число смертей в связи со СПИДом в Западной и Центральной Африке снизилось на **10%**.
- В Западной и Центральной Африке 1,8 миллиона человек имели доступ к антиретровирусной терапии, что составило **28% [23%-34%]** от общего числа людей, живущих с ВИЧ в регионе.
- В 2015 году было зарегистрировано **66 000 [47 000–87 000]** новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей в Западной и Центральной Африке.
  - С 2010 года в **регионе** на **31%** снизилось число новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей.

### **Западная и Центральная Европа и Северная Америка**

- В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ в Западной и Центральной Европе и Северной Америке, составило **2,4 [2,2 – 2,7] миллиона**.
- В 2015 году оценочное число новых случаев инфицирования ВИЧ в регионе составило **91 000 [89 000–97 000]**.
- В 2015 году в Западной и Центральной Европе и Северной Америке **22 000 [20 000–24 000]** людей умерли от болезней, связанных со СПИДом.
- В период с 2010 по 2015 гг. число смертей в связи со СПИДом в регионе снизилось на **24%**.

## Глобальные данные о ВИЧ

	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015/(2016*)
Люди, живущие с ВИЧ	<b>28.9 млн.</b> [26.5 млн.– 31.7 млн.]	<b>31.8 млн.</b> [29.4 млн.– 34.5 млн.]	<b>33.3 млн.</b> [30.8 млн.– 36.1 млн.]	<b>33.9 млн.</b> [31.4 млн.– 36.7 млн.]	<b>34.5 млн.</b> [31.9 млн.– 37.4 млн.]	<b>35.2 млн.</b> [32.6 млн.– 38.1 млн.]	<b>35.9 млн.</b> [33.3 млн.– 38.9 млн.]	<b>36.7 млн.</b> [34.0 млн.– 39.8 млн.]
Новые случаи инфицирования ВИЧ (всего)	<b>3.2 млн.</b> [2.9 млн.– 3.5 млн.]	<b>2.5 млн.</b> [2.3 млн.– 2.8 млн.]	<b>2.2 млн.</b> [2.0 млн.– 2.5 млн.]	<b>2.2 млн.</b> [1.9 млн.– 2.5 млн.]	<b>2.2 млн.</b> [1.9 млн.– 2.4 млн.]	<b>2.1 млн.</b> [1.9 млн.– 2.4 млн.]	<b>2.1 млн.</b> [1.9 млн.– 2.4 млн.]	<b>2.1 млн.</b> [1.8 млн.– 2.4 млн.]
Новые случаи инфицирования ВИЧ (в возрасте 15+ лет)	<b>2.7 млн.</b> [2.5 млн.– 3.0 млн.]	<b>2.1 млн.</b> [1.9 млн.– 2.3 млн.]	<b>1.9 млн.</b> [1.7 млн.– 2.1 млн.]	<b>1.9 млн.</b> [1.7 млн.– 2.2 млн.]				
Новые случаи инфицирования ВИЧ (в возрасте 0-14 лет)	<b>490 000</b> [430 000– 560 000]	<b>450 000</b> [390 000– 510 000]	<b>290 000</b> [250 000– 350 000]	<b>270 000</b> [220 000– 330 000]	<b>230 000</b> [190 000– 290 000]	<b>200 000</b> [160 000– 250 000]	<b>160 000</b> [130 000– 220 000]	<b>150 000</b> [110 000– 190 000]
Смерти в связи со СПИДом	<b>1.5 млн.</b> [1.3 млн.– 1.8 млн.]	<b>2.0 млн.</b> [1.7 млн.– 2.3 млн.]	<b>1.5 млн.</b> [1.3 млн.– 1.7 млн.]	<b>1.4 млн.</b> [1.2 млн.– 1.7 млн.]	<b>1.4 млн.</b> [1.2 млн.– 1.6 млн.]	<b>1.3 млн.</b> [1.1 млн.– 1.5 млн.]	<b>1.2 млн.</b> [990 000– 1.4 млн.]	<b>1.1 млн.</b> [940 000– 1.3 млн.]
Лица, имеющие доступ к лечению	<b>770 000</b> [680 000– 800 000]	<b>2.2 млн.</b> [1.9 млн.– 2.2 млн.]	<b>7.5 млн.</b> [6.6 млн.– 7.8 млн.]	<b>9.1 млн.</b> [8.0 млн.– 9.5 млн.]	<b>11 млн.</b> [9.6 млн.– 11.4 млн.]	<b>13 млн.</b> [11.4 млн.– 13.5 млн.]	<b>15 млн.</b> [13.2 млн.– 15.6 млн.]	<b>18.2 млн.</b> [16.1 млн. – 19.0 млн.] (*июнь 2016) <b>17 млн.</b> [15.0 млн. – 17.7 млн.] (конец 2015)
Ресурсы, доступные на ВИЧ (страны с низким и средним уровнем доходов)	<b>4.8 млрд.</b>	<b>9.4 млрд.</b>	<b>15.9 млрд.</b>	<b>18.3 млрд.</b>	<b>19.5 млрд.</b>	<b>19.6 млрд.</b>	<b>19.2 млрд.</b>	<b>19 млрд.</b>

## Региональные данные – 2015 г.

Регион	Люди, живущие с ВИЧ (всего)	Новые случаи инфицирования ВИЧ			Смерти в связи со СПИДом (всего)	Общее число людей, получающих АРТ
		Всего	В возрасте 15+ лет	В возрасте 0-14 лет		
Восточная и Южная Африка	<b>19,0 млн.</b> [17,7 млн.–20,5 млн.]	<b>960 000</b> [830 000–1,1 млн.]	<b>910 000</b> [790 000–1,1 млн.]	<b>56 000</b> [40 000–76 000]	<b>470 000</b> [390 000–560 000]	<b>10 млн.</b>
Латинская Америка и Карибский бассейн	<b>2,0 млн.</b> [1,7 млн.–2,3 млн.]	<b>100 000</b> [86 000–120 000]	<b>100 000</b> [84 000–120 000]	<b>2100</b> [1600–2900]	<b>50 000</b> [41 000–59 000]	<b>1,1 млн.</b>
Западная и Центральная Африка	<b>6,5 млн.</b> [5,3 млн.–7,8 млн.]	<b>410 000</b> [310 000–530 000]	<b>350 000</b> [270 000–450 000]	<b>66 000</b> [47 000–87 000]	<b>330 000</b> [250 000–430 000]	<b>1,8 млн.</b>
Азиатско-Тихоокеанский регион	<b>5,1 млн.</b> [4,4 млн.–5,9 млн.]	<b>300 000</b> [240 000–380 000]	<b>280 000</b> [220 000–350 000]	<b>19 000</b> [16 000 – 21 000]	<b>180 000</b> [150 000–220 000]	<b>2,1 млн.</b>
Восточная Европа и Центральная Азия	<b>1,5 млн.</b> [1,4 млн.–1,7 млн.]	<b>190 000</b> [170 000–200 000]	<b>190 000</b> [170 000–200 000]	---*	<b>47 000</b> [39 000–55 000]	<b>320 000</b>
Ближний Восток и Северная Африка	<b>230 000</b> [160 000–330 000]	<b>21 000</b> [12 000–37 000]	<b>19 000</b> [11 000–34 000]	<b>2100</b> [1400–3200]	<b>12 000</b> [8 700–16 000]	<b>38 000</b>
Западная и Центральная Европа и Северная Америка	<b>2,4 млн.</b> [2,2 млн.–2,7 млн.]	<b>91 000</b> [89 000–97 000]	<b>91 000</b> [88 000–96 000]	---*	<b>22 000</b> [20 000–24 000]	<b>1,4 млн.</b>

\* Оценочные данные были недоступны на момент публикации

## Антиретровирусная терапия в регионах – 2015 г.

	Процент взрослых людей (в возрасте 15+ лет), живущих с ВИЧ и получающих АРТ	Процент детей (в возрасте 0-14 лет), живущих с ВИЧ и получающих АРТ	Процент беременных женщин, имеющих доступ к АРВ-препаратам для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку
Восточная и Южная Африка	53% [50–57%]	63% [56–71%]	90% [82–>95%]
Латинская Америка и Карибский бассейн	55% [47–64%]	64% [54–76%]	88% [77–>95%]
Западная и Центральная Африка	29% [24–35%]	20% [16–25%]	48% [40–58%]
Азиатско-Тихоокеанский регион	41% [35–47%]	41% [30–37%]	39% [34–44%]
Восточная Европа и Центральная Азия	21% [19–22%]	---	---
Ближний Восток и Северная Африка	16% [12–24%]	20% [16–25%]	12% [9–18%]
Западная и Центральная Европа и Северная Америка	59% [56–68%]	>95% [92–>95%]	92% [87–>95%]
Во всем мире	46% [43–50%]	49% [42–55%]	77% [69–86%]

\* Оценочные данные были недоступны на момент публикации

### Контакты

Communications and Global Advocacy | +41 22 791 1697 | [communications@unaids.org](mailto:communications@unaids.org)

### ЮНЭЙДС

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно сотрудничает с глобальными и национальными партнёрами для того, чтобы положить конец эпидемии СПИДа к 2030 году в рамках Целей устойчивого развития. Вы можете узнать больше на сайте [unaids.org](http://unaids.org) или связавшись с нами через Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.