


! Передозировка наркотическими веществами



В зависимости от того, какой наркотик принимал человек, симптомы передозировки могут различаться и даже быть прямо противоположными.

Тем не менее существуют общепринятые признаки, которые могут указывать на передозировку каких-то препаратов (необязательно наркотических):

- слишком расширенные или суженные зрачки;
- зрачки, которые не изменяются в размере под воздействием света;
- сильное возбуждение и беспокойство, включая бесцельные движения;
- судорожный приступ и/или тремор;
- посиневшие губы и/или ногти;
- бред, дезориентация и/или галлюцинации;
- одышка, редкие вдохи, поверхностное дыхание, остановки дыхания и другие серьезные проблемы с дыханием;
- тошнота и рвота;
- пошатывающаяся или неустойчивая походка;
- сонливость или бессознательное состояние;
- влажная от пота или очень сухая кожа, волдыри или сыпь;
- пониженная или повышенная температура;
- агрессивное поведение.

При обнаружении первых признаков передозировки необходимо действовать быстро:

1. Вызывать скорую медицинскую помощь! Лучше как можно быстрее вызвать скорую помощь. Велика вероятность, что все пойдет по плохому сценарию, поэтому медицинские специалисты должны оценить состояние человека и понять, угрожает ли что-то его жизни.

2. Повернуть человека на бок!

3. Очистить дыхательные пути от рвотных масс и инородных предметов!

4. Следить за характером дыхания!

При судорогах постарайтесь держать человека подальше от острых или опасных предметов. Высокую температуру можно попытаться снизить прохладными компрессами, а также сняв лишнюю теплую одежду с пострадавшего. Если температура низкая, человека нужно согреть (именно поэтому не рекомендуется ставить под холодный душ человека с передозировкой опиоидов, чтобы он взбодрился: в этом случае температура тела и так может быть ниже нормальной).