

Психозы вызванные употреблением марихуаны.

Данный вид психоза может возникнуть даже после первого употребления марихуаны. Весьма близко напоминает картину острой формы шизофрении и свидетельствует о грубых нарушениях в коре головного мозга.

Шизофрения и потребление марихуаны

Употребление повышает риск возникновения шизофрении у подростков:

Однократное употребление до 16 лет — риск возрастает в 2,5 раза

Неоднократное употребление до 16 лет — риск возрастает в 6 раз.

Все каннабиноиды—жирорастворимые вещества, накапливаемые в тканях, богатых липидами: мозге, легких, половых органах, в клеточных мембранах. Проникая в ядра клеток они нарушают процессы синтеза ДНК, РНК и клеточных белков. Высвобождение каннабиноидов в систему кровообращения происходит медленно, в результате чего они могут обнаруживаться в организме в течение длительного периода времени.

Будешь ли ты употреблять марихуану или нет—это предстоит решать тебе самому.

Но главное всегда помнить, что любой твой выбор прежде всего определяет ТВОЕ БУДУЩЕЕ!

Здесь ВЫ можете получить помощь АНОНИМНО:

Советский район:

ул. Жукова, 12;

Центр соц. обслуживания населения.

Понедельник 13.00-17.00

Новобелицкий район:

ул. Склезнева 19,

Центр соц. обслуживания населения.

Понедельник 12.00-16.00

Центральный район:

ул. Ирнинская, 9, КДН.

Среда 14.00-17.00

Железнодорожный район:

ул. 50 лет БССР 19,

Центр соц.обслуживания населения.

Пятница 13.00-17.00

Диспансерное детско-подростковое отделение

диспансеризации и

медицинской реабилитации

Гомель, Богданова, 13

Тел.: 53-34-34

NARCOLOGY.BY

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
учреждение
«Гомельский областной
наркологический диспансер».

Марихуана. Просто факты.



Детско-подростковое отделение
диспансеризации и медицинской
реабилитации
Гомель 2021г.

Марихуана - наркотическое, психоактивное вещество. Существует много мифов связанных с ее употреблением. Марихуану принято называть легким наркотиком, якобы нет вредных последствий и возникновения наркотической зависимости. Мы предлагаем Вам ознакомиться с фактами.

Кратковременное воздействие вызываемое употреблением:

- Эйфория, чувство благополучия, беззаботное состояние, чередующееся с состоянием тревоги и беспокойства
- Ухудшение краткосрочной памяти, понимания, способности выполнения какой-либо задачи
- Изменение восприятия времени и пространства. Повышенная тактильная чувствительность, обострение зрительного и слухового восприятия, обоняния
- Большие количества могут вызвать панику, галлюцинации, беспокойство и дезориентацию.
- Опухание слизистой глаз, воспаленные глаза. Учащение пульса, усиление сердцебиения, повышение кровяного давления
- Колебания температуры тела
- Головная боль, головокружение, тошнота, ощущение голода
- Ухудшение концентрации внимания, нарушение способности правильно оценивать расстояние. Снижение способности к вождению автомобиля и другой деятельности, требующей внимания
- Быстрая речь, безудержная болтливость

Последствия длительного употребления марихуаны для различных систем организма.

МОЗГ. Марихуана влияет на мыслительные способности, способность к пониманию, абстрактному мышлению, обучению. Может вызвать состояние паники, беспокойства и токсические психозы.

ЛЕГКИЕ. Курение марихуаны вызывает все вредные эффекты, свойственные табакокурению: бронхиты, фарингиты, рак легких. Марихуана в большей степени, чем табак, способствует развитию заболеваний верхних дыхательных путей и отека легких.

СЕРДЦЕ. Использование марихуаны вызывает усиленное сердцебиение, учащение пульса и повышение кровяного давления.

РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА. Марихуана содержит аналог растительных женских половых гормонов.

Курение снижает содержание тестостерона, основного мужского гормона. Продолжительное применение марихуаны может изменить гормональный фон настолько, что нарушается развитие половой функции подростков.

У мужчин уменьшается количество мужского гормона – тестостерона и увеличивается количества женских гормонов в результате чего, мужчины, прежде всего молодые, приобретают женские черты; у женщин нарушается менструальный цикл. Нарушается репродуктивная функция как у мужчин так и у женщин. Токсическое воздействие на развитие плода, сложности при вынашивании, тяжелое протекание родов и раннюю смерть младенцев.

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ. Курение марихуаны может оказывать влияние на умственные и физические реакции, нарушать ко-

ординацию. Нарушается ответная реакция человека на световые и звуковые сигналы, ухудшается способность к выполнению последовательных операций и степень восприятия. Появляется сильная потребность двигаться, ходить, разговаривать; характерны неестественные позы в состоянии покоя.

При употреблении марихуаны быстро развивается психическая зависимость.

Признаки реакции организма при прекращении регулярного употребления каннабиноидов.

- Вспыльчивость и раздражительность
- Бессонница, потеря аппетита
- «Сжимающие боли» в голове и сердце, боли в животе
- Озноб и тремор (дрожание)
- Повышение артериального давления, учащенное сердцебиение

Социальные последствия употребления марихуаны

- Социальная самоизоляция
- Переход к более «тяжелым» наркотикам
- Связь с преступностью

